

ANZİBEL 5 mg / 4 mg / 3 mg Bal ve Limon Aromalı Pastil

BİRİM FORMÜLÜ:

Her bir **ANZİBEL 5 mg / 4 mg / 3 mg Bal ve Limon Aromalı Pastil**, etkin madde olarak 5 mg klorheksidin HCl, 4 mg benzokain ve 3 mg enoksolon, yardımcı madde olarak magnezyum stearat ve tatlandırıcı olarak asesülfam potasyum ve sorbitol (E420) içermektedir.

TIBBİ ÖZELLİKLERİ:

ANZİBEL, içerdği aktif maddelerden klorheksidin'in antiseptik etkisi, enoksolon'un bukkofaringeal mukoza üzerindeki antiinflamatuvar etkisi ve benzokain'in lokal anestetik etkisinin bir araya gelmesiyle ağız-boğaz bölgesindeki lokal irritasyonlara bağlı rahatsızlıkların ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.

ÖNERİLEN KULLANIM YERİ:

Ağız ve boğaz bölgesinin hafif enfeksiyöz ve inflamatuvar süreçlerinde lokal ve geçici semptomatik rahatlama sağlar.

KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR:

Ürünün bileşenlerinden herhangi birine veya diğer anestetik etkili ester türevlerine karşı alerjik olduğu bilinen kişilerde kullanılmamalıdır.
Fenilketonürlü hastalarda kullanılmamalıdır.

UYARILAR/ ÖNLEMLER:

Sporcularda kullanım

Bu ürünün bileşiminde, doping kontrolünün pozitif sonuç vermesine neden olabilecek bileşiklerden biri olan benzokain bulunduğu sporcuların dikkatine sunulur.

Yardımcı maddeler hakkında uyarılar

Beher **ANZİBEL** pastilde tatlandırıcı olarak sorbitol mevcuttur. Sorbitol kullanımı mide rahatsızlıkları ve ishal oluşturabilir.

Kalıtımsal fruktoz intoleransı olan kişilerde kullanılmamalıdır.

Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Kullanmakta olduğunuz ilaç var ise muhakkak doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

YAN ETKİLER: .

Nadiren, jeneralize alerjik reaksiyon ve sindirim sistemi bozuklukları bildirilmiştir. Yüksek doz veya uzun süreli kullanım sonucunda ödem (vücutta sıvı tutulumuna bağlı oluşan şişme) ve hipertansiyon meydana gelebilir. Özellikle dişlerinde sert plak birikimi söz konusu olan hastalarda diş pigmentasyonu meydana gelebilir. Hastalarda nadiren tat alma bozukluğu oluşabilir, ancak bu durum tedavinin ilerleyen dönemlerinde giderek azalmaktadır.

İstenmeyen bir etki görüldüğü zaman Sağlık Bakanlığı Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne (TUFAM) bildiriniz.

GÜNLÜK KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

ANZİBEL pastiller ağız ve boğaz bölgesine uygulanır.

12 yaşından büyük çocuklar ve erişkinler için önerilen doz:

2-3 saatlik aralar ile alınan 1 pastil ağızda yavaşça erimeye bırakılır.
Maksimum doz: Günde 8 pastil.

6-12 yaş arasındaki çocuklar için önerilen doz:

4-5 saatlik aralar ile alınan 1 pastil ağızda yavaşça erimeye bırakılır.
Maksimum doz: Günde 6 pastil.

ANZİBEL pastilleri çiğnmeden ve yutmadan ağızda yavaşça eriterek kullanınız.
Pastiller çiğnenmemeli ve yutulmamalıdır; çünkü, lokal etkili bir ürün olan **ANZİBEL** pastil ancak inflamasyonlu ağız-boğaz bölgesine uzun süre direkt temas ettiğinde terapötik fayda sağlamaktadır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

ANZİBEL 5 mg / 4 mg / 3 mg Bal ve Limon Aromalı Pastil, 20 ve 30 pastillik blister ambalajlarda kullanıma sunulur.

PIYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKLLERİ:

ANZİBEL 5 mg / 4 mg / 3 mg Pastil, 20 ve 30 pastillik blister ambalajlarda kullanıma sunulur.

ANZİBEL 5 mg / 4 mg / 3 mg Mentollü Pastil, 20 ve 30 pastillik blister ambalajlarda kullanıma sunulur.

İZİN SAHİBİ VE ADRESİ:

NOBEL İLAÇ SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.
ÜMRANİYE 34768 İSTANBUL

ÜRETİCİ İSİM VE ADRESİ:

NOBEL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Sancaklar 81100 DÜZCE

İZİN TARİHİ VE NO: 24.08.2006 2006/57

SADECE ECZANELERDE SATILIR.