

KULLANMA TALİMATI

FUNİT 100 mg mikropellet kapsül Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** Her bir kapsül 100 mg itrakonazol içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Hidroksi propil metil selüloz, polietilen glikol, nötral mikrogranüller, titanyum dioksit, azorubin (E122), patent mavi V ve karamel renk, jelatin (sığır kaynaklı).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*

• *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

• *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*

• *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*

• *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. FUNİT nedir ve ne için kullanılır?

2. FUNİT'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. FUNİT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. FUNİT'in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. FUNİT nedir ve ne için kullanılır?

- FUNİT, vajina (kadınlarda iç üreme organlarıyla dış üreme organlarını birbirine bağlayan hazne), cilt, ağız, gözler, tırnaklar ya da iç organların mantar hastalıklarını (enfeksiyon) tedavi etmede kullanılan bir ilaçtır.
- Her birinde 100 mg itrakonazol içeren pembe opak / kahverengi renkli sert jelatin kapsüller halinde 4, 15 ve 30'luk blisterlerde sunulmaktadır.

2. FUNİT'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FUNİT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- FUNİT'e karşı aşırı duyarlı olduğunuz biliniyorsa;
- Hamileyseniz (doktorunuzun da gebe olduğunuzu bilerek kullanmanıza izin verdiği durumlar dışında);
- Doğurganlık çağında olan bir kadınsanız ve gebe kalma olasılığınız varsa, ilacı almaktaayken gebe kalmamanız için uygun doğum kontrol yöntemlerini kullanmalısınız. FUNİT, kullanımına son verildikten sonra bir süre daha vücudunuzda kalmaya devam edeceğinden, tedaviniz bitip FUNİT'i kullanmayı bıraktıktan sonra da bir sonraki adet dönemimize kadar kullandığımız doğum kontrol yöntemine devam etmelisiniz.
- Kalp yetmezliğiniz varsa (kalbin pompalama yeteneğinin bozularak yetmezliğe girdiği bir durum olan "konjestif kalp yetmezliği" olarak da adlandırılır), FUNİT yetmezlik durumunu daha da kötüleştirir. Doktorunuzun bu hastalığınızı bilmesine rağmen sizde FUNİT kullanımını gerekli bulunduğu durumlarda, artan nefes darlığı, beklenmeyen kilo artışı, bacaklarınızda şişkinlik, alışılmamış yorgunluk hali olursa ya da geceleri uykunuzdan uyanmaya başlarsanız hemen doktorunuza ya da bir hastanenin acil servisine başvurunuz.

FUNİT'i kullanmaktayken aşağıdaki ilaçları kullanmayınız:

- Alerjik durumlar için kullanılan terfenadin, astemizol ve mizolastin gibi ilaçlar;
- Anjina ağrıları (göğüste sıkıştıracı ağrı ile seyreden kalp hastalığı) ve yüksek tansiyon için kullanılan bepridil ve nisoldipin;
- Belirli sindirim rahatsızlıkları için kullanılan sisaprid;
- Simvastatin, lovastatin ve atorvastatin gibi kolesterol düzeyini düşüren belirli ilaçlar;
- Uyku ilaçları olan midazolam ve triazolam;
- Pimozid ve sertindol gibi ruhsal durum bozukluklarında kullanılan ilaçlar;
- Morfin benzeri uyuşturucu bağımlılığının tedavisinde kullanılan levasetilmetadol;
- Migren tedavisinde kullanılan eletriptan ve ergot türevi ilaçlar olarak bilinen dihidroergotamin ve ergotamin;
- Doğumdan sonra rahimin kasılarak eski haline gelmesi ve doğumdan sonraki kanamanın kontrolü için kullanılan ergometrin (ergonovin) ve metilergometrin (metilergonovin) gibi diğer ergot türevi ilaçlar;
- Kinidin ve dofetilid adındaki kalbinizin bozulan ritmini düzeltmek amacıyla kullanılan ilaçlar;
- Sıtma hastalığının tedavisinde kullanılan halofantrin;
- Kalbin ritminin bozulduğu bazı durumlarda kullanılan disopiramid;
- Metadon gibi bağımlılığa karşı kullanılan ilaçlar;
- Felodipin gibi hipertansiyona karşı kullanılan ilaçlar.

FUNİT'i, aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Bazı ilaçların birlikte alınması zararlı olabileceğinden, birlikte ilaç kullandığınızı her durumda doktorunuza ya da eczacınızı bilgilendiriniz.
- Karaciğerinizle ilgili bir rahatsızlığınız varsa doktorunuza bilgilendiriniz. FUNİT dozunuzun ayarlanması gerekebilir.
- Şu belirtilerin görülmesi durumunda FUNİT kullanımına son vererek hemen doktorunuza başvurunuz: İştah kaybı, bulantı, kusma, yorgunluk, karın ağrısı ve idrar renginin çok koyulaşması. FUNİT almanız gerekiyorsa doktorunuz sizden düzenli olarak bazı kan tahlilleri yaptırmanızı da isteyebilir. Bunun nedeni, FUNİT kullanırken çok seyrek olarak bu tür karaciğer hastalıkları oluşabileceğinden, olası bir karaciğer hastalığını zamanında yakalayabilmek içindir.
- Kalbinizle ilgili bir rahatsızlığınız varsa doktorunuza bilgilendiriniz. Bu durumda size FUNİT reçetelense, kullanım sırasında dikkatle gözlemeniz gereken bazı belirtilerden bahsedecektir. Eğer nefes darlığı, beklenmeyen kilo artışı, bacaklarınızda şişkinlik, alışılmamış yorgunluk hali olursa ya da geceleri uykunuzdan solunum durması nedeni ile uyanmaya başlarsanız hemen doktorunuza haberdar ediniz.
- Böbreklerinize ilgili bir rahatsızlığınız varsa doktorunuza bilgilendiriniz. FUNİT dozunuzun ayarlanması gerekebilir.
- FUNİT kullanırken el ve ayaklarınızda alışılmamış karıncalanma, uyuşma ya da halsizlik hissederseniz derhal doktorunuza bilgilendiriniz.
- Geçmişte başka bir mantar ilacı kullanmaktayken alerjik belirtiler görülmüşse bu durumdan doktorunuza haberdar ediniz.
- Nötropeniz (kandaki lökosit adı verilen beyaz kürelerin sayısının azalması) varsa, AIDS hastasıysanız ya da size organ nakli yapıldıysa bu durumdan doktorunuza haberdar ediniz. FUNİT dozunuzun ayarlanması gerekebilir.
- FUNİT kullanmaktayken işitme kaybınız olursa ilacı keserek hemen doktorunuza bilgilendiriniz. Çok seyrek olarak FUNİT kullanılarak hastalarda geçici ya da kalıcı işitme kaybı olabileceği

bildirilmiştir.

- Karbonhidrat metabolizması bozukluklarınız varsa doktorunuza bilgilendiriniz.
- Flukonazole dirençli mantar türleri için duyarlılık, FUNİT tedavisine başlamadan test edilmelidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

FUNİT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Her zaman için FUNİT'i tam bir öğünden hemen sonra almalısınız; çünkü bu şekilde ilaç vücudunuza çok iyi alınacaktır. Kapsülleri bir miktar suyla yutunuz. FUNİT'in vücudunuza geçebilmesi için midenizde yeteri kadar asit olmalıdır. Bu nedenle mide asidini etkisizleştiren ilaçlar, FUNİT alındıktan sonraki 2 saat içinde alınmamalıdır. Aynı nedenle midenizin asit üretmesini engelleyen bir ilaç kullanıyorsanız, FUNİT'i kolalı bir içeceklerle almalısınız.

Herhangi bir durumda kuşkunuz olursa doktor veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

- Hamileyseniz FUNİT kullanmayınız.
- Doğurganlık çağında olan bir kadınsanız ve gebe kalma olasılığınız varsa, ilacı alırken gebe kalmamanız için uygun doğum kontrol yöntemlerini kullanmalısınız. FUNİT, kullanımına son verildikten sonra bir süre daha vücudunuzda kalmaya devam edeceğinden, tedaviniz bitip FUNİT'i kullanmayı bıraktıktan sonra da bir sonraki adet dönemimize kadar kullandığımız doğum kontrol yöntemine devam etmelisiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziren bir anneyseniz FUNİT kullanmadan önce doktorunuza danışınız; FUNİT çok az miktarlarda sütünüze geçebilir.

Araç ve makine kullanımı

Bazı durumlarda araç ve makine kullanımı sırasında baş dönmesi, görme bozukluğu, işitme kaybı gibi yan etkiler oluşabilir, dikkatli olunmalıdır.

Çocuklarda kullanımı

FUNİT normalde çocuklarda kullanılmaz, ancak doktorunuz istisnai durumlarda çocuklarda da FUNİT reçeteleyebilir.

FUNİT'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçindeki yardımcı maddelerden azorubin, alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Doktor veya eczacımıza halen kullanmakta olduğunuz ilaçları bildirin. Bazı ilaçlar birlikte alınmaz ve belirli bazı ilaçları alırken de bazı ayarlamaların yapılması, örneğin ilacınızın dozunun ayarlanması gerekebilir. FUNİT kullanmaktayken hiç kullanılmaması gereken ilaçlara örnek olarak aşağıdaki ilaçlar verilebilir:

- Alerjik durumlar için kullanılan terfenadin, astemizol ve mizolastin gibi ilaçlar;
- Anjina ağrıları (göğüste sıkıştıracı ağrı ile seyreden kalp hastalığı) ve yüksek tansiyon için kullanılan bepridil ve nisoldipin;
- Belirli sindirim rahatsızlıkları için kullanılan sisaprid;
- Simvastatin ve lovastatin gibi kolesterol düzeyini düşüren belirli ilaçlar;
- Uyku ilaçları olan midazolam ve triazolam;
- Pimozid ve sertindol gibi ruhsal durum bozukluklarında kullanılan ilaçlar;
- Morfin benzeri uyuşturucu bağımlılığının tedavisinde kullanılan levasetilmetadol;
- Migren tedavisinde kullanılan ve ergot türevi ilaçlar olarak bilinen dihidroergotamin ve ergotamin;
- Doğumdan sonra rahimin kasılarak eski haline gelmesi için kullanılan ergometrin (ergonovin) ve metilergometrin (metilergonovin) gibi diğer ergot türevi ilaçlar;
- Kinidin ve dofetilid adındaki kalbinizin bozulan ritmini düzeltmek amacıyla kullanılan ilaçlar;
- Metadon gibi bağımlılığa karşı kullanılan ilaçlar;
- Felodipin gibi hipertansiyona karşı kullanılan ilaçlar;

Bazı ilaçlar FUNİT'in etkinliğini önemli ölçüde azaltabilir. Bu durum özellikle epilepsi (kasılma nöbetleriyle seyreden bir hastalık; sara hastalığı) tedavisinde kullanılan (örneğin karbamazepin, fenitoin ve fenobarbital) ilaçlar ve verem hastalığında kullanılan (örneğin rifampisin, rifabutin ve izoniyazid) ilaçlar için geçerlidir. Bu nedenle bu ilaçlardan herhangi birini kullandığınız her durumda doktorunuza bilgilendiriniz ki, uygun önlemler alınabilsin.

Diğer bazı ilaçların birlikte kullanılması durumunda FUNİT ya da bu ilaçların dozunda bazı değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Bu ilaçlara örnek olarak aşağıdakiler verilebilir:

- Klaritromisin, eritromisin ve rifabutin gibi bazı antibiyotikler;
- Kalp ve kan damarlarına etkili bazı ilaçlar (digoksin, disopiramid, kalsiyum kanal blokleri olarak adlandırılan bazı ilaçlar, silostazol);
- Kan pıhtılaşmasını azaltan ilaçlar;
- İltihabi durumlar, astım ve alerji durumlarında ağız yoluyla, enjeksiyonla ya da solunum yoluyla kullanılan metilprednizolon, budesonid, flutikazon ve deksametazon gibi ilaçlar;
- Genellikle bir organ naklinden sonra kullanılan siklosporin A, takrolimus ve rapamisin (sirolimus olarak da bilinir) gibi ilaçlar;
- HIV protez inhibitörü olarak bilinen belirli ilaçlar;
- Kanseri tedavisi için kullanılan belirli ilaçlar;
- Buspiron, alprozolam ve brotizolam gibi endişe (anksiyete) durumlarında ve uyku bozukluklarını tedavi etmek için kullanılan (trankilizan) bazı ilaçlar;
- Alerji durumlarında kullanılan ebastin;
- Depresyon durumlarında (mizacın çökkün olmasıyla seyreden bir hastalık) kullanılan reboksetin;
- Migren tedavisinde kullanılan eletriptan;
- Ağrılar için güçlü bir ilaç olan fentanil;
- Sıtma tedavisinde kullanılan halofantrin;
- Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan repaglinid.

Bu ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza bilgilendiriniz.

FUNİT'in vücudunuza geçebilmesi için midenizde yeteri kadar asit olmalıdır. Bu nedenle mide asidini etkisizleştiren ilaçlar, FUNİT alındıktan sonraki 2 saat içinde alınmamalıdır. Aynı nedenle midenizin asit üretmesini engelleyen bir ilaç kullanıyorsanız, FUNİT'i kolalı bir içeceklerle almalısınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. FUNİT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

– Her zaman için FUNİT'i tam bir öğünden hemen sonra almalısınız; çünkü bu şekilde ilaç vücudunuza çok iyi alınacaktır. Kapsülleri bir miktar suyla yutunuz. Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne kadar süreyle

uygulanacağına doktorunuz karar verecektir (Buna yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacın size uygulama nedeni olan mantar hastalığının tipi ile hastalığın görüldüğü organınıza göre karar verecektir.)
Genellikle aşağıdaki dozlarda kullanılır:

ENFEKSİYONUN TİPİ	GÜNDE ALINACAK KAPSÜL SAYISI	NE KADAR SÜREYLE
*Vajina enfeksiyonu	Günde iki defa 2 kapsül veya	1 gün
	Günde bir defada 2 kapsül	3 gün
*Cilt enfeksiyonu	Günde bir defada 2 kapsül veya	7 gün
	Günde bir defada 1 kapsül	2 hafta
	Avcu içlerinizle ayak tabanınızda da hastalık olması durumunda 7 gün süreyle günde iki defada 2 kapsül ya da bir ay süreyle günde tek defada 1 kapsül almanız gerekebilir.	
*Ağız içi enfeksiyon	Günde bir defada 1 kapsül	2 hafta
*Göz enfeksiyonu	Günde bir defada 2 kapsül	3 hafta
*Vücut iç organlarında enfeksiyon	Günde 1-4 kapsül	Daha uzun sürelerle
*Tırnak enfeksiyonu	Bireysel gereksiniminize göre doktorunuz devamlı ya da aralıklı tedavi uygulayacaktır.	

- Tırnak enfeksiyonu için devamlı tedavi Günde bir defada 2 kapsül 3 ay
- Tırnak enfeksiyonu için aralıklı tedavi Günde iki defada 2 kapsül 1 hafta

Bu 1 haftalık kullanımdan sonra FUNİT kullanımına 3 hafta ara verilir. Daha sonra el tırnaklarındaki enfeksiyonlar için bir kür, ayak tırnaklarındakiler içinse (el tırnaklarında olsun veya olmasın) iki kür daha uygulanır (Aşağıdaki tabloya bakınız).

	Hafta 1	Hafta 2	Hafta 3	Hafta 4	Hafta 5	Hafta 6	Hafta 7	Hafta 8	Hafta 9	Hafta 10
YALNIZ EL TIRNAKLARI	Günde iki defada 2 kapsül				Günde iki defada 2 kapsül					
El tırnaklarında olsun veya olmasın AYAK TIRNAKLARI	Günde iki defada 2 kapsül				Günde iki defada 2 kapsül				Günde iki defada 2 kapsül	

Cilt enfeksiyonlarında tedaviye son verildikten birkaç hafta sonra derideki hastalıklı bölgeler düzelecektir. Bu mantarlarla olan yama tarzındaki cilt belirtileri için tipiktir: ilaç mantarın kendisini öldürmektedir, ama derideki hastalıklı bölge ancak bu bölgede yeniden sağlıklı deri büyümesiyle ortadan kalkmaktadır.

Tırnak enfeksiyonlarındaki hastalıklı alan ise, ilaç yalnızca mantarı öldürdüğünden tedaviye son verildikten 6 ila 9 ay sonra düzelmektedir. Tırnağın, mantarlar öldükten sonra da uzamasına gerek vardır ve bu aylar alabilir. Dolayısıyla tedaviniz sırasında bir iyileşme belirtisi görülmezse endişelenmeyiniz: ilaç tırnaklarınızda uzunca bir süre kalmaya ve etkisini göstermeye devam edecektir. Bu nedenle herhangi bir düzelmeye görmesiniz bile doktorunuzun önerdiği sürede tedaviyi kesmelisiniz.

İç organların enfeksiyonunda daha yüksek dozlarla daha uzun süre tedavi gerekebilir.
- FUNİT'i zamanında almayı unutmayınız.
- Doktorunuz FUNİT ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Uygulama yolu ve metodu:

FUNİT, ağız yoluyla bir miktar suyla yutulur alınır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım

FUNİT normalde çocuklarda kullanılmaz, ancak doktorunuz istisnai durumlarda çocuklarda da FUNİT reçeteleyebilir.

Yaşlılarda kullanım

Yaşlılarda da erişkin dozları kullanılır.

Özel kullanım durumları:

Karaciğer yetmezliği

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılırken, dikkatli olunmalıdır.

Böbrek yetmezliği

Böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılırken, dikkatli olunmalıdır.

Eğer FUNİT'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınıza ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla FUNİT kullandıysanız

FUNİT'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

FUNİT'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, FUNİT' in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, FUNİT'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- FUNİT'e karşı aşırı duyarlılık görülme sıklığı seyrek. Aşırı duyarlılık örneğin deride döküntüler, kaşıntı, kurdeşen, nefes darlığı ya da soluk alıp vermede zorluk ve/veya yüzde şişme gibi belirtilerle tanınabilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FUNİT'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Çok seyrek olarak güneş ışığına karşı aşırı hassasiyet, bacaklarda uyuşma veya deride ağır bir hastalıkta (ağız içinde, gözlerde ve genital bölgede deride soyulmalarla seyreden yaygın kızarıklık ve su toplanması, küçük iltihaplı sivilceler veya su toplanması ile seyreden kızarıklık) görülebilir. Bu belirtilerden herhangi birinin görülmesi durumunda da FUNİT kullanmayı keserek doktorunuza başvurunuz.

Eğer nefes darlığınızda artış oluyorsa, beklenmedik bir şekilde kilonuz artmışsa, bacaklarınızda şişme oluşmuşsa, alışılmamış bir halsizlik ve yorgunluk durumunuz varsa ya da daha önceleri yokken geceleri uykudan uyanmaya başlamışsanız hemen doktorunuza bildirin.

Aşağıdaki belirtilerden biri ya da birden fazlası karaciğerde oluşan bir hastalığın habercisidir ancak bunlar çok seyrek olarak görülür: İştahta azalma, bulantı, kusma, halsizlik, karın ağrısı, sarılık, idrar renginde ileri derecede koyulaşma ve dışkımanızın renginde açılma. Böyle durumlarda FUNİT kullanmayı keserek, hemen doktorunuza başvurunuz.

İşitme kaybı olursa da FUNİT kullanmayı keserek, hemen doktorunuza başvurunuz.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza söyleyiniz:

Bu bölümdeki yan etkiler oluşum sıklığına göre verilmiştir. Bu nedenle, aşağıdaki sıklık kategorileri ve birimleri kullanılmıştır:

Yaygın (10 hastadan en az birinde görülebilir)

- Karın ağrısı, bulantı,

Yaygın olmayan (100 hastanın en az birinde görülebilir)

- Kadınlarda adetle ilgili bozukluklar
- Baş ağrısı, sersemlik hali, örneğin ayaklarda cilde yakın bölgelerde karıncalanma, uyuşukluk hissi
- Kabızlık, ishal, nefes darlığı, kusma, hazımsızlık ve mideye ekşime, ağızda hoş olmayan tat hissi
- Deride 24 saat içinde kaybolan kızarıklıklar, kaşıntı, vücutta sıvı birikmesine bağlı şişlikler
- Kanda özellikle karaciğer, safra yollarının bozukluklarında yükselen bilirübin, alanin aminotransferaz, aspartat aminotransferaz enzimlerinin yükselmesi
- Saç dökülmesi
- Aşırı duyarlılık

Seyrek (1000 hastanın en az birinde görülebilir)

- Sık idrara çıkma
- Görmede bulanıklık ya da çift görme
- Kanda bağışıklık sisteminde görev alan beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma
- His kaybı
- Karaciğer enzimlerinde yükselme
- Kulaklarda çınlama,
- Nefes almada güçlük
- Ateşlenme

Aşağıda verilen yan etkilerin sıklığı bilinmemektedir.

- Kanda pıhtılaşmayı sağlayan trombosit adı verilen hücrelerin sayısının azalması
- Kanda bağışıklık sisteminde görev alan nötrofil adı verilen hücrelerinin sayısında azalma
- Ani başlangıçlı kalp atım sayısının yükselmesi, terleme, nefes almada güçlük, ateşin yükselmesi gibi belirtilerle giden hızla müdahale gerektiren alerjik durum
- Kanda yağ taşınmasında görev alan trigliserid miktarında artış
- El ve ayak gibi uç organlarda güçsüzlük veya duyu kaybı artışı
- Görmede bulanıklık, çift görme
- Kaslarda ağrı, eklemelerde ağrı
- Kalbin kan pompalama görevini yapamaması (kalp yetmezliği)
- Sertleşme problemi
- Sarılık, karaciğer iltihabı
- Ciltte alerjik reaksiyonlar, ışığa bakamama
- İşitme kaybı (kalıcı olabilir)
- Kanda potasyum seviyesinde azalma
- İdrar kaçırma

Bunlar FUNİT'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bildirin.

Yan Etkilerin Raporlanması:

Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca yan etkileri www.tıck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TUFAM)'ne bildirebileceğiniz gibi, 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını da kullanabilirsiniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlanış olacaktır.

5. FUNİT' in saklanması

FUNİT'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

İşıktan ve nemden koruyarak saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FUNİT'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş
Ümraniye 34768 İSTANBUL

Üretim yeri:

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş
Sancaklar 81100 DÜZCE

Bu kullanma talimatı 26/08/2016 tarihinde onaylanmıştır.